

中医妇科单方验方选



湖南省中医研究所編
湖南人民出版社

73
)

編号：(湘)1737

中医妇科单方驗方选

編者：湖南省中 医 药 研 究 所

出版者：湖 南 人 民 出 版 社

(湖南省书刊出版业营业許可証出字第一号)

长沙市新村路

印刷者：湖 南 省 新 华 印 刷 厂

长沙市兴汉门口

发行者：湖 南 省 新 华 书 店

开本：787×1092 1/32

印张：1 1/4

字数：20,000

1959年8月第一月

1959年8月第1次印刷

印 数：1——8,000

统一书号：14109·37

定价：(6)一角一分

編者的話

在旧社会里，很多妇女把自己一些隱微的疾患，不肯告訴別人，以致不能即時进行治疗，由小病变成大病。这种情况，現在还不能完全消除，特别是农村实现人民公社化以后，妇女从家务劳动中彻底解放出来，同男子一道，参加祖国各項建設工作，成为各个生产战綫上的生力軍，因之妇女的健康問題，也就更形重要。

这本小冊子，搜集了我省民間屢試有效的单方、驗方160个，分調經、产前、产后、杂症四类加以整理而成。所用葯物，都是一般人所共曉的，不但取用方便，而且非常經濟，完全合乎精簡節約的原則。可供各地医务人员、广大妇女群众選擇采用。

湖南省中医葯研究所

一九五九年四月

目 录

調 經

处女經閉(二方).....	(1)
妇女月經久閉(二方).....	(1)
月經提前(一方).....	(2)
月經退后(一方).....	(2)
月經日期前后不对(一方)	(2)
月經太多(一方).....	(3)
月經太少(一方).....	(3)
痛經(三方).....	(3)
經漏(一方).....	(4)
干血癆(一方).....	(4)
月經逆行(二方).....	(4)
經期吐血(一方).....	(5)
月經不止(四方).....	(5)
撞紅(一方).....	(6)

胎 前

习惯性流产(二方).....	(7)
胎漏下血不止(一方).....	(7)
胎动下血(一方).....	(7)
胎前腰痛(一方).....	(8)
恶阻(二方).....	(8)
子肿(一方).....	(8)

胎动下血(一方).....	(9)
孕妇动紅势欲小产(一方)	(9)
胎动不安(一方).....	(9)
鼻血(一方).....	(9)
嘔吐(一方).....	(9)
胎上冲心(二方).....	(10)
腹痛(二方).....	(10)
瘡疾(一方).....	(11)
痢疾(二方).....	(11)
血痢(一方).....	(11)
子煩(一方).....	(11)
子淋(一方).....	(12)
尿閉(二方).....	(12)
尿血(一方).....	(12)
孕妇无故下血(二方).....	(13)
孕妇下黄水(一方).....	(13)
难产(四方).....	(13)
子死腹中(四方).....	(14)

产 后

血暈(六方).....	(15)
胞衣不下(六方).....	(16)
阴戶翻出(一方).....	(18)

产后鼻血(一方)·····(18)	产后不語(一方)·····(24)
产后大便不通(一方)·····(18)	堕胎下血(一方)·····(24)
产后血痛(一方)·····(18)	乳汁不下(六方)·····(24)
恶露不下(二方)·····(18)	
	杂 症
产后阴戶肿痛(一方)·····(19)	赤白带(九方)·····(26)
产后肛門外翻(一方)·····(19)	崩漏(一方)·····(28)
产后恶露不尽(三方)·····(19)	血崩不止(十六方)·····(28)
产后崩中(二方)·····(20)	乳岩初起(一方)·····(31)
恶血冲心(二方)·····(20)	乳岩已潰(二方)·····(31)
产后口渴(一方)·····(21)	乳痛(六方)·····(32)
产后下痢(一方)·····(21)	乳吹(二方)·····(33)
产后腹脹(一方)·····(21)	乳头破裂(二方)·····(33)
产后遺尿(一方)·····(21)	妇人回乳(一方)·····(34)
产后尿血(一方)·····(22)	血淋(一方)·····(34)
产后尿不禁(一方)·····(22)	癥瘕(一方)·····(34)
产后尿閉(一方)·····(22)	阴挺(三方)·····(34)
产后阴肿(一方)·····(22)	阴痒(二方)·····(35)
产門不閉(一方)·····(23)	乳头紅肿(一方)·····(35)
产后虚汗(一方)·····(23)	阴疮(一方)·····(36)
产后中风(一方)·····(23)	阴烂(一方)·····(36)
产后发热(一方)·····(23)	阴痛(一方)·····(36)
产后滿悶(一方)·····(23)	阴肿痛(一方)·····(36)
产后浮肿(一方)·····(24)	

調 經

婦女正常的行經期，是每二十八天一次，經過三至五天，就干淨了。如果因工作过于劳累，或心情不愉快，或受寒受热以及其他原因，就会影响月經的正常，若不及时治疗，就可以使身体逐漸衰弱，妨碍受孕。在月經期不正常的情況下，运用一些葯物来进行治疗，使之恢复正常，在医学上就叫作“調經”。

处女經閉

(一)

主治 处女长期經閉，手足心热，小腹痛。

处方 归尾一錢 沒葯一錢 紅花五分

用法 将归尾、沒葯研末，用紅花浸酒冲服，每日一服，經通为止。

(二)

主治 处女經閉。

处方 茜草三錢

用法 以水煎服三剂，如仍未通，再服三剂必效。

妇女月經久閉

(一)

主治 月經久閉不通，小腹痛。

处方 蚕沙四两

用法 炒成黄色，以酒水各半煎滚，滤去蚕沙，入磁瓶貯之，每日温飲一杯，自通。

(二)

主治 平日身体很好，月經正常，忽然經閉不通。

处方 絲瓜絡一团

用法 燒成灰，用酒送服三錢，数服即通。

月經提前

主治 月經先期来潮，小腹微痛。

处方 干芹菜

用法 煎水下面条，常服最效。

月經退后

主治 月經過期而来，小腹痛。

处方 丹参六錢

用法 研細，每次用二錢，兌温酒服下。

月經日期前后不对

主治 經期或前或后，不能按期而行。

处方 月季花十二朵

用法 泡酒服，如月經淡少加当归三錢，經色紫紅，小腹脹痛加丹皮三錢。

月經太多

- 主治** 行經時，月經過多。
處方 血余炭(即頭髮燒灰)不拘多少
用法 研末，開水沖服，每次約五分。

月經太少

- 主治** 經水太少，小腹痛。
處方 當歸一兩(切) 紅花五錢 白酒半斤
用法 將當歸、紅花浸入酒內，時時搖動，數日可服。一日服二次，每次一酒杯，服時用開水盪溫。

痛 經

(一)

- 主治** 經期小腹痛。
處方 蒲黃(炒)三錢 五靈脂三錢
用法 用布包煎，分四次服。

(二)

- 主治** 經期小腹痛。
處方 丹參半斤
用法 研末，用酒為丸，臨睡前服二錢。

(三)

- 主治** 經期小腹痛

处方 桃仁七粒(研) 百草霜一錢(研細)

用法 用酒水各半冲服。

經 漏

主治 月經經久不斷。

处方 車前子半斤(炒)

用法 每次用車前子一两煎水服。

干 血 癆

主治 长期經閉，肌肉瘦削，皮膚干枯，五心煩熱。

处方 白鴿一只(去肚腸) 血竭(經閉一年者一两，二年者二两，三年者三两)

用法 將血竭放白鴿腹內，用針綫縫合，用水煮熟，吃時兌少量酒。

月經逆行

(一)

主治 月經不行口鼻出血。

处方 陈墨

用法 將墨磨水一杯，令病者服之，其血即止。再用归尾、紅花各一錢煎服，其經即順。

(二)

主治 月經不行口鼻出血。

处方 韭菜汁一杯 童便半杯

用法 蒸热服。

經期吐血

主治 月經将来时，咳痰吐血。

处方 木耳一两

用法 燒灰研末，每日空心用开水兌少量白酒調服一茶匙。

月經不止

(一)

主治 月經来后，淋漓不止。

处方 羊前左脚脛骨一条 棕灰

用法 将羊脛骨用紙包裹泥，令干，煨赤，入棕灰各等分，每服一錢，温酒送下。

(二)

主治 月經来后，淋漓不止。

处方 烂蒲扇燒灰

用法 每次用酒調服一錢。

(三)

主治 月經来后，淋漓不止。

处方 紅鷄冠花

用法 晒干研末，每服二錢，空心酒調下，忌魚腥猪肉。

(四)

主治 月經来后,淋漓不止。

处方 黄茧壳三两燒灰 陈棕灰四錢

用法 开水冲服。

撞 紅

主治 月經初来时性交,使行經不暢,或少腹痛。

处方 明雄三錢研細末水飞。

用法 好酒分二次冲服。

胎 前

健康的妇女,从受孕一直到临产,是不会发生什么病痛的,在受孕的二三月期間,有一点恶心嘔吐,这还是怀孕初期的应有現象,不治也可自癒。但如体質較弱,受孕后,抵抗力可能更弱,就更容易受病。因受病影响胎的,把病治好,胎也自安;如因身体虚弱,胎动不安,以致发生阴道出血,甚至流产的,那就應該着重安胎。也有因体質衰弱,形成习惯性的流产,这是妇女一件非常苦惱的事情。因此,在受孕以后,無論发生任何一种病的情况,給以早期治疗,是完全必要的。

习惯性流产

(一)

- 主治** 妇女受孕后，经常在三、四月内滑胎，不能孕育。
- 处方** 南瓜蒂
- 用法** 将南瓜蒂放瓦上炙灰存性，研末，自受孕两月起，每月吃一个，拌入炒米粉内同食。

(二)

- 主治** 妇女受孕后，经常在三、四月内滑胎，不能孕育。
- 处方** 鵪鶉蛋一个 人参三分
- 用法** 将鵪鶉蛋开一小孔，纳入人参，用纸将孔封固，隔水燉熟，或飯上蒸熟，每月吃一个。

胎漏下血不止

- 主治** 妇女受孕后，下血不止。
- 处方** 生地五錢 阿膠珠一两
- 用法** 将阿膠珠研末，生地煎濃汁，两味和勻，分二次服。

胎动下血

- 主治** 孕妇胎动下血。
- 处方** 葱白一把
- 用法** 煮濃汁，飲汁，胎未死即安，已死即出。

胎前腰痛

主治 怀孕后经常腰痛。

处方 猪腰子一个

用法 入盐少许，焙干为末，蜜丸如黄豆大，空心酒下五十丸即愈。

恶阻

(一)

主治 妊娠嘔吐。

处方 伏龙肝（灶心土）一两

用法 水煎温服。

(二)

主治 妊娠嘔吐，口不渴者。

处方 砂仁五分

用法 研成末，用姜汁米汤和吞。

子肿

主治 孕妇头面及下肢浮肿。

处方 茯苓皮一两 葵花子三钱

用法 水煎温服。

胎动下血

- 主治** 胎动下血不止。
处方 五倍子一两
用法 研末，酒調服每次二錢，甚效。

孕妇动紅势欲小产

- 主治** 孕妇小便多，动紅，势欲小产。
处方 葱头二十根
用法 煎水温服极效。

胎动不安

- 主治** 孕妇胎动不安。
处方 南瓜蒂煨研
用法 糯米湯送下。

鼻血

- 主治** 孕妇鼻血。
处方 白茅根一束
用法 煎濃汁冷服。

嘔吐

- 主治** 孕妇嘔吐。

处方 竹茹三錢 陈皮一錢

用法 水煎溫服。

胎上冲心

(一)

主治 孕婦胎上冲心。

处方 蘿蔔或根

用法 煮濃汁服即安。

(二)

主治 孕婦胎上冲心

处方 艾叶一團

用法 煮汁頻服。

腹 痛

(一)

主治 孕婦腹痛不止。

处方 大紅棗十四枚

用法 燒焦為末，童便調服。

(二)

主治 孕婦腹痛

处方 干荷葉一張。

用法 炙研，糯米泔一杯調服。

瘧疾

主治 孕婦患瘧疾。

处方 夜明砂末三錢

用法 空心溫酒服。

痢疾

(一)

主治 孕婦患痢疾。

处方 梔子(煨、研)

用法 上藥用熱酒調，空心服一匙，甚者不過五服。

(二)

主治 孕婦患痢疾。

处方 荷葉蒂七個

用法 燒灰存性，研末，酒沖服，奇效。

血痢

主治 孕婦患血痢。

处方 阿膠二兩

用法 酒水各半燉化，頓服。

子煩

主治 孕婦心驚胆怯，終日煩悶不安。

处方 竹瀝(即竹油)一杯

用法 兌少量熱開水一次飲，立愈。

子 淋

主治 孕婦小便澀痛。

处方 桑螵蛸一兩

用法 研末，每服二錢，空心米湯飲下。

尿 閉

(一)

主治 孕婦尿閉。

处方 杏仁一兩 燈心一小束

用法 將杏仁去皮尖，抖爛，丸如菉豆大，用燈心湯吞七丸。立利。

(二)

主治 孕婦尿閉。

处方 葱白一束

用法 葱白細切和鹽炒熱，熨臍下立通。

尿 血

主治 孕婦尿血

处方 阿膠一兩

用法 炒黃為末，食前粥飲下二錢。

孕妇无故下血

(一)

主治 孕妇阴道流血不止。

处方 桃树上不落桃子烧灰

用法 温水调服即愈。

(二)

主治 孕妇阴道流血。

处方 鸡蛋两个

用法 粥汤搅熟服。

孕妇下黄水

主治 孕妇阴道下黄水。

处方 干荷叶蒂一个

用法 炙研，糯米泔汁一杯调下。

难产

(一)

主治 妇人临产，胎儿数日不出。

处方 芒硝二钱 童便一杯

用法 童便煨热，纳芒硝融化后温服，效验极好。

(二)

主治 孕妇临产，胎儿数日不下。

处方 蜂蜜、真麻油各半碗

用法 同煎，分二次服即下，并下死胎。

(三)

主治 孕妇临产，胎儿数日不下。

处方 龟甲五钱

用法 烧研末，酒服一钱。

(四)

主治 孕妇临产，胎儿数日不下，

处方 蝉退五钱

用法 烧灰，水调服一钱即下。

子死腹中

(一)

主治 死胎不下。

处方 艾叶鸡子大一团

用法 酒水各半，煎成一碗，分二次服。

(二)

主治 死胎不下。

处方 大黑豆一杯

用法 以醋煮浓汁，顿服立出。

(三)

主治 死胎不下。

处方 羊血

用法 热飲一小杯，极效。

(四)

主治 死胎不下。

处方 鷄子黄一个 姜汁一酒杯

用法 二味和服即下。

产 后

在反动統治时期，很多家境困难的妇女，特别是农村的劳动妇女，在产后数日内，就从事体力劳动，因而造成許多长期痛苦的疾病，如子宫下垂，肛門外翻、崩漏等，严重影响妇女身体健康。解放后，党和政府极度关怀妇女的健康，規定在产前和产后有一定时期的休养，这些产后疾患，就大大减少了。但是这只是防的一方面，如果已經有了病，积极采取治疗，也是很重要的。

血 暈

(一)

主治 产后血暈，不省人事。

处方 半夏研末

用法 以水为丸如黄豆大，納鼻中即醒。

(二)

主治 产后血暈

处方 苏木一两
用法 酒水各半煎服。

(三)

主治 产后血暈

处方 血竭一两研末

用法 每用二錢，温酒調下。

(四)

主治 产后血暈，不省人事。

处方 韭菜切

用法 置于瓶內，沃以热醋，令气入鼻即醒。

(五)

主治 产后血暈，不省人事。

处方 童便一杯

用法 将童便盪热，灌之即醒。

(六)

主治 产后血暈，不省人事。

处方 干漆渣或破漆器

用法 燒烟薰之即醒，或将磚石秤錘燒紅，投入陈醋內，对鼻孔薰之即醒。

胞衣不下

(一)

主治 产后胞衣不下。

处方 芡实叶一张

用法 扯作二三片，煎服即下，或用荷叶，功亦相同。

(二)

主治 产后胞衣不下。

处方 产妇自己头发

用法 将头髮塞入口中，打一恶心即下。

(三)

主治 产后胞衣不下。

处方 生鸡蛋两个，去黄用白。

用法 用好陈醋烧开冲服即下。

(四)

主治 产后胞衣不下。

处方 蓖麻子十四粒去壳

用法 捣烂，敷两足心，胎衣即下，衣下后，急将药洗去。

(五)

主治 产后胞衣不下。

处方 黄草纸

用法 烧烟薰鼻极效。

(六)

主治 产后胞衣不下。

处方 葱白一把

用法 煎浓汤薰洗即下。

阴戶翻出

主治 产后阴戶翻出，名曰翻花。
处方 泽兰叶四两 枯矾五錢
用法 煎湯薰洗二三次即安。

产后鼻血

主治 产后鼻血不止。
处方 荆芥穗炒黑研末
用法 用童便調服即愈。

产后大便不通

主治 产后大便不通。
处方 大麦芽炒研
用法 每服三錢，开水調服。

产后血痛

主治 产后恶露不下，小腹作痛。
处方 山查(炒)一两
用法 煎濃汁，入沙糖少許，再煎热服。

恶露不下

(一)

主治 产后恶露不下。

处方 生藕一斤
用法 搗汁燉溫服。

(二)

主治 产后恶露不下。

处方 苏木一两
用法 酒水煎服。

产后阴戶腫痛

主治 妇人产后，阴戶肿痛。

处方 甘草五錢 蛇床子一两 虫退二錢
用法 煎水洗。

产后肛門外翻

主治 产后肛門向外翻出疼痛。

处方 木别子一枚
用法 用水磨成濃汁塗患处。

产后恶露不尽

(一)

主治 产后日久，恶露不尽。

处方 头髮鷄子大一团
用法 灰水洗淨，燒存性，酒調服二錢。

(二)

主治 产后穢污不尽，腹满心闷，手足烦热。

处方 玄胡索五钱(炒研)

用法 以酒调服二钱甚效。

(三)

主治 产后恶露不尽。

处方 灶心土研末

用法 酒调服二钱，泻出恶露立效。

产后崩中

(一)

主治 产后血多不止。

处方 乌鸡子三个

用法 用醋酒各一杯与鸡子捣匀，煮取汁一杯，分三次服。

(二)

主治 产后流血不止。

处方 百草霜三钱

用法 研末酒调下。

恶血冲心

(一)

主治 产后或流产，血气上冲，心痛欲死。

处方 玉京三錢
用法 燒存性研末，米醋調灌即癒。

(二)

主治 产后血气上冲，心痛甚剧。

处方 山查一两（炒枯）

用法 童便煎服。

产后口渴

主治 产后口渴不止。

处方 蜂蜜一杯

用法 开水冲服即止。

产后下痢

主治 产后下痢，里急后重，不拘赤白。

处方 紫萸菜一握切細 粳米半杯

用法 二味共煮粥，食之即癒。

产后腹脹

主治 产后腹部脹滿。

处方 麦芽一两

用法 研末和酒服。

产后遺尿

主治 孕婦产后遺尿。

处方 桑螵蛸半两（炙） 龙骨一两
用法 共为末，每次米湯調服二錢。

产后尿血

主治 产后小便带血。

处方 牛夕三錢
用法 水煎頻服。

产后尿不禁

主治 产后小便不能自制。

处方 桑螵蛸四錢（炙） 龙骨六錢（煨） 牡力六錢（煨）
用法 共为末，每次开水調服三錢。

产后尿閉

主治 产后小便不通。

处方 广皮一两
用法 研末温酒調服二錢。

产后阴肿

主治 产后阴部肿大。

处方 桃仁二两（燒黃）
用法 研末涂敷，其肿漸消。

产門不閉

- 主治** 产后阴道不閉。
处方 石灰一斤（炒黃）
用法 放木盆內，以热水注之，澄清后洗阴部。

产后虛汗

- 主治** 产后汗多。
处方 小麦麸一两 牡力一两
用法 共研末，以猪肉汁調服二錢，日服二次。

产后中风

- 主治** 产后中风，口噤身直，面青，手足抽搐。
处方 竹油一杯
用法 开水兌服即愈。

产后发热

- 主治** 产后发热口渴。
处方 生藕汁一杯 生地五錢
用法 将生地煮汁合藕汁服。

产后滿悶

- 主治** 产后胸腹滿悶，不思飲食。

处方 赤小豆27粒(燒研)

用法 冷开水冲服。

产后浮肿

主治 产后面目四肢浮肿。

处方 柑皮

用法 每次三錢,以酒煎服。

产后不語

主治 产后不語。

处方 党参三錢 石菖一錢 石蓮肉五錢

用法 水煎服。

墮胎下血

主治 妇人墮胎,下血不止。

处方 代者石一錢(研) 生地五錢

用法 将生地濃煎,調服代者石末,日三五次,以瘥为度。

乳汁不下

(一)

主治 产后乳汁不下或过少。

处方 当归五錢 黄芪八錢 王不留行三錢 白通草二錢

公猪蹄一个

用法 上药合煎，待猪蹄煮烂即成，令产妇吃猪蹄及喝汤，最多二剂，乳汁即下。

(二)

主治 产后乳少。

处方 瓜蒌仁一两（炒）

用法 研末，酒服一钱，复面睡一夜，乳汁即下。

(三)

主治 产后乳汁不下或过少。

处方 三稜五钱

用法 煎汁洗奶，以乳汁出为度，极妙。

(四)

主治 产后乳汁不下或过少。

处方 鳊鱼一条 冬瓜皮一把

用法 二味同煮，食鱼喝汤，乳汁即下。

(五)

主治 产后乳汁不下或过少。

处方 豆腐一斤 鲜虾半斤 猪蹄一对

用法 水煮频服。

(六)

主治 产后乳汁不下或过少。

处方 活大虾二十只

用法 用青布包虾挤取汁，再加少量白酒，蒸熟食之。

杂 症

妇女杂症較多，如崩带、乳部和阴部等疾患。这些病的产生，很多与月經、胎前、产后有关。但如能在平常注意經期卫生，胎前产后注意保养，这些病就可能少发生或不发生。

在妇科病中，应注意崩漏与月經過多不同，崩漏是长期阴道出血，月經過多是行經时血量加多。因此在治疗上也有所不同。此外如带下及阴道和乳部等疾患，也都有損身体健康，发现有病，就应早治，不可忽略。

赤 白 带

(一)

主治 赤白带下，年久不癒，諸药不效。

处方 貫仲一个

用法 将貫仲揉去毛及花萼，用米醋湿透，慢火烤焦，研为細末，空心米湯服二錢。

(二)

主治 赤白带多。

处方 白扁豆二两（炒）

用法 研末，每次用米湯調下二錢。

(三)

主治 赤白帶很多，年久不癒。

处方 槐枝一把

用法 燒灰，食前酒下一匙，日服二次。

(四)

主治 赤白帶多。

处方及用法 用酒煮艾叶及鷄蛋，日日食之。

(五)

主治 赤白帶下，年久不癒。

处方 陈东瓜子四两（炒）

用法 研末，每日空心米湯服五錢。

(六)

主治 赤白帶多。

处方 香椿根去粗皮一把

用法 用米泔水一碗燉，空心服。

(七)

主治 赤白帶下，年久不癒。

处方 蓮蓬壳（炙）

用法 研末，用鷄蛋煮熟，去黃取白，裹末而服，甚效。

(八)

主治 赤白帶下，年久不癒。

处方 白木槿花根二两 公鷄一只

用法 公鷄去头足及內脏，將此根放入鷄腹，加酒少許，

燉服。

(九)

主治 赤白帶下，年久不癒。

处方 經霜小絲瓜一莖二寸長

用法 置新瓦上炙黃為末，每用二錢，臨臥用開水送下。

崩 漏

主治 身體過勞，陰道下血。

处方 百草霜 陳棕灰各一兩 發灰五錢

用法 共為末，每服一錢，陳酒送下即止。

血崩不止

(一)

主治 月經過多，血崩不止。

处方 陳棕燒灰 棉子燒灰

用法 共研細末，每用一錢，米醋送下。

(二)

主治 血崩諸藥不效者。

处方及用法 用多年舊烟袋杆，紫色油透者佳，截一寸，燒灰，酒調服，屢試屢驗。

(三)

主治 血崩諸藥不效者。

处方 舊棕墊一塊

用法 燒灰，置瓦上收火氣，清晨用溫開水沖服三四錢。

(四)

主治 血崩諸藥不效者。

處方 貫仲五錢

用法 酒煎服，立止。

(五)

主治 血崩諸藥不效者。

處方 楊樹葉（燒灰）二兩

用法 水煎去浮末，加白糖服。

(六)

主治 血崩諸藥不效者。

處方 夏枯草

用法 晒干研末，每服一匙，米湯調下。

(七)

主治 血崩諸藥不效者。

處方 槐米二兩

用法 燒存性，研末，每服一匙，溫酒下。

(八)

主治 血崩諸藥不效者。

處方 核桃仁十五枚

用法 燒灰存性，研末，一次空心溫酒調服即止。

(九)

主治 血崩諸藥不效者。

处方 生藕

用法 搗取汁，热水冲服。或藕节七个煎湯服亦效。

(十)

主治 月經過多，血崩不止。

处方 五灵脂一两

用法 半生半炒，研末，每服二錢，温酒調下极驗。

(十一)

主治 月經過多，血崩不止。

处方 木耳四两

用法 将木耳煮熟，加紅糖二两拌勻，一次服完，二三次即癒。

(十二)

主治 血崩暈倒，暴下血流盈盆，勢甚危急。

处方 貫仲雌雄各一个(長者为雄，小而圓者为雌。)

用法 燒灰存性，研为細末，酒水調服。

(十三)

主治 血崩暈倒

处方 棉花子一两 柏子仁三錢

用法 炒焦存性，共研細末，空心开水調服二錢。

(十四)

主治 血崩暈倒

处方 旱蓮草五錢

用法 上葯煮鷄蛋食之，立效。

(十五)

主治 血崩不止。
处方 晚蚕沙二两
用法 砂鍋內炒黃，為末，每次酒調服四錢，甚效。

(十六)

主治 赤白帶下，年久黃瘦不癒。
处方 蕎麥一斤
用法 炒黑為末，用鷄蛋清為丸如黃豆大，每服五十丸，空心淡鹽湯下，早晚各一次。

乳岩初起

主治 乳岩初起，乳內生一小粒，初如豆大，漸大如塊，不痛不痒，至一至二三年后，漸漸腫痛潰爛。
处方 蒲公英
用法 搗爛敷患处。

乳岩已潰

(一)

主治 乳岩已經潰爛。
处方 生蟹壳数十个
用法 砂鍋內焙焦為末，每服二錢，好酒調服，勿間斷。

(二)

主治 乳岩已經潰爛。

处方 陈年老南瓜蒂 (三十)

用法 燒灰,好酒送服,外用麻油調南瓜蒂灰涂。

乳 癰

(一)

主治 乳部紅腫疼痛。

处方 蒲公英二兩

用法 搗爛兌酒,汁內服,渣敷乳上,睡片刻,數次即癒。

(二)

主治 乳部腫痛,乳汁不通。

处方 川貝四錢

用法 研末,酒調服二錢,仍令人吮之即通。

(三)

主治 乳部腫痛。

处方 蒲公英一兩 金銀花藤二兩

用法 水煎熱服。

(四)

主治 乳部腫痛,乳汁不通。

处方 山甲四錢(炮)

用法 研末,酒沖服一錢,日二次,外以油梳梳乳即通。

(五)

主治 乳部腫痛。

处方 活小鯽魚一尾 芋頭一個

用法 鯽魚去腸雜，合芋頭同搗爛，敷患处，发痒即癒。

(六)

主治 乳部肿痛。

处方 苧麻根

用法 搗爛敷患处即消。

乳 吹

(一)

主治 乳吹紅腫疼痛。

处方 白胡椒

用法 研末，放普通黑膏藥上貼患处，两次即消。

(二)

主治 乳吹紅腫疼痛。

处方 山甲三錢 橘紅二錢

用法 水煎和酒服。

乳 頭 破 裂

(一)

主治 乳頭破裂，出水疼痛。

处方 秋月冷露茄子裂開者

用法 陰干，燒存性，研末，水調塗之即癒。

(二)

主治 乳頭破裂，出水疼痛。

处方 龟板五錢(炙) 冰片少許
用法 共研細末,麻油調敷。

妇人回乳

主治 乳母因給小兒隔奶,乳房脹痛。
处方 炒麦芽一两
用法 煎濃汁飲之,不过二服即脹消乳止。

血淋

主治 小便時出血,刺痛不可忍。
处方 发灰二錢 藕汁一杯
用法 調服,三日即癒。

癥瘕

主治 妇女下腹部生硬块,按之痛,月經不調。
处方 冬青叶一把 酒糟一杯
用法 將冬青叶搗爛,入酒糟同炒熱,敷患处,冷則換之,数次即癒。

阴挺

(一)

主治 妇女子宮下垂到阴道外。
处方 蛇床子五兩 烏梅十四個

用法 煎湯分多次薰洗。

(二)

主治 子宮下垂。

处方 白菓

用法 杵融敷之甚效。

(三)

主治 子宮下垂。

处方 五加皮二兩

用法 煎汁，日服數次，并用汁日洗患處數次。

陰 痒

(一)

主治 婦女陰部奇痒不止。

处方 蛇床子一兩 白矾二錢

用法 煎湯頻洗。

(二)

主治 婦人陰門腫痒。

处方 大蒜瓣

用法 煎湯洗之，能消腫止痒。

乳頭紅腫

主治 乳頭紅腫疼痛。

处方 僵蚕

用法 研末,开水調敷乳头。

阴 瘡

主治 妇人阴部生瘡很痒。

处方 硫黄

用法 研末,有水者干搽,无水者香油調搽。

阴 烂

主治 妇人阴部烂臭。

处方 牡力(煨)三錢 滑石三錢 陈蚌壳(煨)二錢

人中白、龙骨各錢半 冰片二分

用法 共研末摻之。

阴 痛

主治 阴瘡烂痛。

处方 杏仁(燒黑)二两

用法 研如泥,敷患处。

阴 肿 痛

主治 阴道肿痛。

处方 馬齿莧

用法 搗烂,敷数次即消。

[G e n e r a l I n f o r m a t i o n]

书名 = 中医妇科单方验方选

作者 =

页数 = 36

出版社 =

出版日期 =

SS号 = 10386815

DX号 =

URL = <http://book1.duxiu.com/bookDetail.jsp?dxNumber=&d=204018350E153ABB9B73FEB82B56715>

封面
版权
前言
目录
调经

处女经闭（二方）
妇女月经久闭（二方）
月经提前（一方）
月经退后（一方）
月经日期前后不对（一方）
月经太多（一方）
月经太少（一方）
痛经（三方）
经漏（一方）
干血癆（一方）
月经逆行（二方）
经期吐血（一方）
月经不止（四方）
撞红（一方）

胎前

习惯性流产（二方）
胎漏下血不止（一方）
胎动下血（一方）
胎前腰痛（一方）
恶阻（二方）
子肿（一方）
胎动下血（一方）
孕妇动红势欲小产（一方）
胎动不安（一方）
鼻血（一方）
呕吐（一方）
胎上冲心（二方）
腹痛（二方）
疟疾（一方）
痢疾（二方）
血痢（一方）
子烦（一方）
子淋（一方）
尿闭（二方）
尿血（一方）
孕妇无故下血（二方）
孕妇下黄水（一方）
难产（四方）
子死腹中（四方）

产后

血晕（六方）
胞衣不下（六方）
阴户翻出（一方）
产后鼻血（一方）
产后大便不通（一方）
产后血痛（一方）
恶露不下（二方）
产后阴户肿痛（一方）
产后肛门外翻（一方）
产后恶露不尽（三方）
产后崩中（二方）
恶血冲心（二方）
产后口渴（一方）

产后下痢（一方）
产后腹胀（一方）
产后遗尿（一方）
产后尿血（一方）
产后尿不禁（一方）
产后尿闭（一方）
产后阴肿（一方）
产门不闭（一方）
产后虚汗（一方）
产后中风（一方）
产后发热（一方）
产后满闷（一方）
产后浮肿（一方）
产后不语（一方）
堕胎下血（一方）
乳汁不下（六方）

杂症

赤白带（九方）
崩漏（一方）
血崩不止（十六方）
乳岩初起（一方）
乳岩已溃（二方）
乳痈（六方）
乳吹（二方）
乳头破裂（二方）
妇人回乳（一方）
血淋（一方）
症瘕（一方）
阴挺（三方）
阴痒（二方）
乳头红肿（一方）
阴疮（一方）
阴烂（一方）
阴痛（一方）
阴肿痛（一方）